

Pero, 19 febbraio 2025 | n.319

Gentile Cliente,

EPIK SL (Reg. n° 16325 del 26.02.2015): adeguamento dei livelli massimi di residui (LMR) per i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva Acetamiprid, ai sensi del nuovo Reg. (UE) 2025/158

Con Decreto Dirigenziale del 19 febbraio 2025 è stata autorizzata la modifica dell'etichetta ministeriale del p.f. EPIK SL, nel rispetto dei nuovi LMR per la s.a. Acetamiprid, previsti dal Reg. (UE) 2025/158. I nuovi LMR, sebbene in vigore dal 19 febbraio 2025, saranno applicabili a decorrere dal 19 agosto 2025, data oltre la quale tutti i prodotti freschi e trasformati dovranno essere adeguati ai nuovi limiti.

Di seguito elenchiamo le variazioni rispetto alla precedente etichetta autorizzata:

- **Numero di interventi e massimo dosaggio:**
 - 1 appl. x 2 L/ha per melone, cocomero e zucca (campo e serra), pomodoro (campo e serra) e peperone (campo), cetriolo e zucchini (campo);
 - 1 appl. x 1,5 L/ha per mele, pere, mele cotogne, nespole, pesche, nettarine, albicocche, ciliegie, amarene, cetriolo e zucchini (serra), vite da vino e da tavola;
 - 1 appl. x 1,2 L/ha per olivo da tavola;
 - 1 appl. x 1 L/ha per dolcetta e rucola (campo e serra);
- **Cambio del numero dei giorni pre-raccolta a:**
 - 45 gg** per vite da vino e da tavola;
 - 30 gg** per mele, pere, pesche, nettarine, albicocche;
 - 28 gg** per olivo da tavola;
 - 10 gg** per pomodoro (serra), cetriolo e zucchini (serra);
 - 5 gg** per dolcetta e rucola (campo).
- **Eliminazione degli usi:** peperone (serra), cavoli, broccoli, cavolfiori, lattughe (campo e serra), lamponi, more di rovo, spinaci, bietola da foglia e da costa.

Raccomandiamo di fornire ai rivenditori e/o distributori autorizzati un facsimile della nuova etichetta.

E' possibile scaricare l'etichetta anche dal sito Internet all'indirizzo www.sipcamitalia.it alla pagina del prodotto oppure tramite il servizio SDS OnDemand <http://sdsondemand.imaginenetwork.com/it/> previa registrazione.

EPIK® SL

**Insetticida-aficida sistemico
in formulazione liquida
Classificazione IRAC: Gruppo 4A**

EPIK SL - Composizione:

- Acetamiprid puro g 4,67 (=50 g/l)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Sospetto di nuocere al feto (H361d). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410).

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non disperdere nell'ambiente (P273). Indossare guanti/indumenti protettivi. (P280). In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico (P308+P313). Raccogliere la fuoriuscita (P391). Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali in accordo alla regolamentazione nazionale (P501).

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

SIPCAM ITALIA S.p.A.

Sede legale: via Carroccio 8 – Milano

Tel. +39 02/353781

Officine di produzione e/o confezionamento:

SIPCAM OXON S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

SIPCAM Inagra SA - Sueca (Spagna)

KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)

ALTHALLER ITALIA S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

INDUPHARMA S.R.L. – Via Sorgaglia n. 40 - 35020 Arre (PD)

CHEMIA S.p.A. – Via statale, 327 – Dosso – Terre del Reno (FE)

DIACHEM S.p.A. – via Mozzanica 9/11 – 24043 Caravaggio (BG)

FERBI S.r.l. – viale 1° Maggio – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Autorizzazione Ministero della Salute n. 16325 del 26.02.2015

Distribuito da:

ITAL-AGRO S.r.l. – Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: ml 1,5–3–5–7,5–10–15–20–25–50–100–200–250–500

Litri 1–2–3–5–10–20

Partita n.:



ATTENZIONE

Per proteggere gli uccelli evitare l'irrigazione mediante aspersione degli ortaggi a foglia fino ad un giorno dopo l'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

EPIK SL agisce sui più importanti fitofagi ad apparato boccale pungente-succhianti e ad apparato boccale masticatore. Il prodotto agisce prevalentemente per ingestione.

Caratterizzato da attività citotropica-translaminare e da elevata sistemica, EPIK SL consente anche la difesa degli organi vegetativi sviluppatasi dopo il trattamento.

COLTURE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Le dosi vengono riportate sia in mL/hL che in L/ha per l'utilizzo di volumi normali. Per l'impiego a volumi ridotti con attrezzature idonee rispettare sempre e comunque le dosi ad ettaro riportate in etichetta.

Impiegare le dosi maggiori con forti intensità di pressione degli insetti.

Non superare la dose massima ad ettaro indicata.

COLTURA	FITOFAGI	No. appl.	DOSE	Giorni pre raccolta
Agrumi (arancio, mandarino, compreso clementine ed altri ibridi, limone, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, arancio amaro, mapo, tangelo)	Afidi, Aleurodidi (<i>Aleurotrixus</i> sp., <i>Aleurocactus</i> sp.), Cimici (<i>C. trivialis</i> , etc), Mosca (<i>C. capitata</i>), Minatrice serpentina, Cocciniglie (<i>Planococcus</i> sp., <i>Aonidiella</i> sp.)	2	133-200 mL/hL (2 L/ha)	14
	<i>Bactrocera dorsalis</i> Cicaline (<i>E. decedens</i> , etc)		100-150 mL/hL (1,5 L/ha)	
Pomacee (melo, pero)	Afidi (compreso Afide lanigero, <i>E. lanigerum</i>), Maggolino (<i>M. melolontha</i>), Mosca (<i>C. capitata</i>) <i>Popillia japonica</i> Psille (adulti), Tentredini, Minatori fogliari (<i>Leucoptera</i> sp., <i>Lithocolletis</i> sp., <i>Phyllonorycter</i> sp.), Cicaline, Metcalfa, Antonomo, Miridi, Cimici (compresa <i>Halyomorpha halys</i>)	1	100-150 mL/hL (1,5 L/ha)	30
Pomacee (cotogno, nespolo)	Afidi (compreso Afide lanigero, <i>E. lanigerum</i>), Maggolino (<i>M. melolontha</i>), Mosca (<i>C. capitata</i>) <i>Popillia japonica</i> Psille (adulti), Tentredini, Minatori fogliari (<i>Leucoptera</i> sp., <i>Lithocolletis</i> sp., <i>Phyllonorycter</i> sp.), Cicaline, Metcalfa, Antonomo, Miridi, Cimici (compresa <i>Halyomorpha halys</i>)	1	100-150 mL/hL (1,5 L/ha)	14
Drupacee (Susino, Prugnolo)	Afidi, Mosche (<i>C. capitata</i> , <i>R. cerasi</i>), <i>Drosophila suzukii</i> , Tortrice (<i>Cacoecia rosana</i>) <i>Popillia japonica</i> , <i>Bactrocera dorsalis</i>	2	133-200 mL/hL (2 L/ha)	14

® marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Usare guanti adatti durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto. Indossare guanti, tuta protettiva standard e calzature antinfortunistiche (o stivali di sicurezza) durante l'applicazione del prodotto. Non rientrare nelle aree trattate prima che la coltura risulti completamente asciutta. Indossare guanti e abbigliamento da lavoro prima di effettuare eventuali lavorazioni manuali sulle colture trattate.

Per proteggere gli organismi acquatici seguire le seguenti misure di mitigazione:

- rispettare una fascia non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 metri per pomacee e pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio, amarena e prugnolo, 20 metri per agrumi, vite da vino e da tavola, fragole;

- rispettare una fascia vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di 20 metri per olivo, insalate (dolcetta/valerianella/gallinella, rucola, prodotti baby leaf), portulache ed erbe fresche, 10 metri per solanacee, cucurbitacee con buccia commestibile, cucurbitacee con buccia non commestibile, legumi freschi e da granella, carciofo, patata, frumento, tabacco, floreali ed ornamentali e vivai di piante madri di vite.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

COLTURA	FITOFAGI	No. appl.	DOSE	Giorni pre raccolta
	Minatori fogliari, Cicaline (<i>Empoasca</i> sp., <i>Z. flammigera</i> , <i>C. viridis</i>), Metcalfa, Miridi, Cimici (compresa <i>Halyomorpha halys</i>)		100-150 mL/hL (1,5 L/ha)	
Drupacee (Ciliegio, Amarena)	Afidi, Mosche (<i>C. capitata</i> , <i>R. cerasi</i>), <i>Drosophila suzukii</i> , Tortrice (<i>Cacoecia rosana</i>)	1	100-150 mL/hL (1,5 L/ha)	14
Drupacee (Pesco, Nettare, Albicocco)	<i>Popillia japonica</i> , <i>Bactrocera dorsalis</i> , Minatori fogliari, Cicaline (<i>Empoasca</i> sp., <i>Z. flammigera</i> , <i>C. viridis</i>), Metcalfa, Miridi, Cimici (compresa <i>Halyomorpha halys</i>)	1	100-150 mL/hL (1,5 L/ha)	30
Vite (da vino e da tavola)	Cocciniglie (<i>Planococcus</i> sp., <i>Heliothrips</i> sp.), <i>Partenolecanium</i> sp.), Mosca (<i>C. capitata</i>), <i>Drosophila suzukii</i> , Fillossera, Afidi, Tripidi estivi (escluso <i>F. occidentalis</i> su uva da tavola), Aleurodidi (<i>Aleurococcus</i> sp.), Tignola e Tignoletta <i>Popillia japonica</i> , Cicadellidi (<i>Empoasca</i> sp., <i>Z. rhamni</i> , <i>S. titanus</i> , <i>H. obsoletus</i>), Minatori fogliari (<i>Antispila</i> sp.; <i>Phyllocnistis</i> sp.; <i>Holocacysta</i> sp.), Cimici, <i>Anomala vitis</i> , <i>Melolontha</i> sp., Metcalfa	1	100-150 mL/hL (1,5 L/ha)	45
Olivo (per produzione di olio)	Mosca (<i>Bactrocera oleae</i>), Tignola (<i>Prays oleae</i>), Sputacchina (<i>Philaenus spumarius</i>) Cecidomia fogliare dell'olivo (<i>Dasineura oleae</i>)	2	100-150 mL/hL (1,5 L/ha)	21
Olivo (per olive da tavola)		1	120-150 mL/hL (1,2 L/ha)	28
Fragola Pieno campo e serra	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, <i>Drosophila suzukii</i> , Antonomo	2	125 mL/hL (1,25 L/ha)	3
Solanacee (pomodoro, peperone) Pieno campo	Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Dorifora, Miridi, Minatori fogliari (<i>Liriomyza</i> sp.), Cimici (<i>N. viridula</i> , <i>P. prasina</i> , etc.), Cicadellidi (<i>Empoasca</i> sp., <i>H. obsoletus</i>)	1	200-333 mL/hL (2 L/ha)	7
	<i>Popillia japonica</i> , <i>Bactrocera dorsalis</i> , Piralide		150-250 mL/hL (1,5 L/ha)	
Solanacee (pomodoro) serra	Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Dorifora, Miridi, Minatori fogliari (<i>Liriomyza</i> sp.), Cimici (<i>N. viridula</i> , <i>P. prasina</i> , etc.), Cicadellidi	1	200-333 mL/hL (2 L/ha)	10

COLTURA	FITOFAGI	No. appl.	DOSE	Giorni pre raccolta
	(<i>Empoasca</i> sp., <i>H. obsoletus</i>) <i>Popillia japonica</i> , <i>Bactrocera dorsalis</i> , Piralide	1	150-250 mL/hL (1,5 L/ha)	10
Solanacee (melanzana) Pieno campo e serra	Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Dorifora, Miridi, Minatori fogliari (<i>Liriomyza</i> sp.), Cimici (<i>N. viridula</i> , <i>P. prasina</i> , etc.), Cicadellidi (<i>Empoasca</i> sp., <i>H. obsoletus</i>) <i>Popillia japonica</i> , <i>Bactrocera dorsalis</i> Piralide	2	200-333 mL/hL (2 L/ha)	7 (pieno campo) 3 (serra)
			160-267 mL/hL (1,6 L/ha)	
Cucurbitacee con buccia non commestibile (Melone, Cocomero, Zucca, etc.) Pieno campo e serra	Afidi, Aleurodidi <i>Popillia japonica</i> , <i>Bactrocera dorsalis</i>	1	150-333 mL/hL (1,5-2 L/ha)	14
Cucurbitacee con buccia commestibile (Cetriolo, Zucchini, etc.) Pieno campo	Afidi, Aleurodidi <i>Popillia japonica</i>	1	150-333 mL/hL (1,5-2 L/ha)	7
Cucurbitacee con buccia commestibile (Cetriolo, Zucchini, etc.) serra			150-250 mL/hL (1,5 L/ha)	10
Dolcetta/valeria nella/gallinella, rucola pieno campo e serra	Afidi, Altica, Cicaline, Minatori fogliari, Tripidi, Miridi <i>Popillia japonica</i>	1	125-167 mL/hL (1 L/ha)	5
Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) pieno campo e serra	Afidi, Altica, Cicaline, Minatori fogliari, Tripidi, Miridi <i>Popillia japonica</i>	1	250 mL/hL (2 L/ha)	10 (pieno campo) 5 (serra)
Portulache (agretti, barba del frate, salicomia, finocchi marini, astri marini, limonio/statiche, claitonia/lattuga dei minatori/ portulaca invernale, fico degli ottentotti/ unghie di strega) Pieno campo	Afidi, Altica, Cicaline, Minatori fogliari, Tripidi, Miridi <i>Popillia japonica</i>	1	250 mL/hL (2 L/ha)	10
Erbe fresche (cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, foglie di alloro, etc.) Pieno campo e serra	Afidi, Cicaline, Minatori fogliari, Miridi <i>Popillia japonica</i>	1	250 mL/hL (2 L/ha)	10 (pieno campo) 5 (serra)

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

COLTURA	FITOFAGI	No. appl.	DOSE	Giorni pre raccolta
Carciofo	Afidi	2	150-250 mL/hL (1,5 L/ha)	7
Legumi Freschi (Fagioli, Fagiolini, Piselli) Legumi da Granella (Fagioli, Piselli, Fave, Cece e Cicerchia)	Afidi, Tripidi, Minatori fogliari	2	160-267 mL/hL (1,6 L/ha)	14
Patata	Afidi, Dorifora, Miridi	2	130-217 mL/hL (1,3 L/ha)	14
Frumento	Afidi, Cimici, <i>Oulema</i> sp.	2	125-200 mL/hL (1 L/ha)	28
Erba medica	Afidi, Fitodecta, <i>Apion</i> sp.	2	63-83 mL/hL (0,5 L/ha)	14
Tabacco	Afidi, Pulce (<i>Epitrix</i> sp.) <i>Popillia japonica</i>	1	200-333 mL/hL (2 L/ha)	14
Cotone	Afidi	1	125-200 mL/hL (1,3 L/ha)	14
Floreali ed ornamentali. Pieno campo e serra	Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cimici, Cicaline, Minatori fogliari, Maggiolino, Cicadellidi	2	150-333 mL/hL (1,5-2 L/ha)	-
	<i>Popillia japonica</i>		200-333 mL/hL (2 L/ha)	
Vivai di piante madri di Vite	Afidi, Fillossera, Cicadellidi, Cocciniglie (<i>Planococcus</i> sp., <i>Heliooccus</i> sp.), Minatori fogliari (<i>Antispila</i> sp.; <i>Phyllocnistis</i> sp.; <i>Holocacysta</i> sp.)	2	150-333 mL/hL (1,5-2 L/ha)	-
	<i>Popillia japonica</i>		200-333 mL/hL (2 L/ha)	
Colture Portaseme destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme): vedasi nota sottostante (*) Pieno campo e serra	Afidi, Aleurodidi, Cimici, Tripidi, Altiche, Cicadellidi, Minatori fogliari, Apion, Fitodecta, Cavallette	2	150-333 mL/hL (1,5-2 L/ha)	-
	<i>Popillia japonica</i>		200-333 mL/hL (2 L/ha)	

Nota (*): Solanacee (Pomodoro, Melanzana, Peperone, etc.), Cucurbitacee con buccia non commestibile (Melone, Cocomero, Zucca, etc.), Cucurbitacee con buccia commestibile (Cetriolo, Zucchini, etc.), Lattughe e altre insalate comprese le Brassicacee, Spinaci e simili, Erbe fresche, Coriandolo, Cavoli ad infiorescenza, Fagioli, Fagiolini, Fave, Piselli, Ceci, Lenticchie, Lupini, Cicerchie, Carciofo, Erba medica, Frumento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Divieto di impiego in fioritura.

Si raccomanda di assicurare una completa ed uniforme bagnatura su tutta la vegetazione, utilizzando volumi di acqua e pressioni di esercizio più elevate su colture di difficile bagnatura. In caso di applicazioni a volume ridotto aumentare la concentrazione della miscela al fine di mantenere la stessa dose di prodotto ad ettaro utilizzata nei trattamenti a volume normale.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Riempire la botte dell'irroratore per il 30-50% del suo contenuto, versare la dose prestabilita tenendo costantemente in agitazione. Portare quindi la botte a pieno volume.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con formulati a base di sostanze attive di nuova introduzione, effettuare saggi preliminari di miscibilità prima di trattare su larga scala.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Su colture ornamentali e floreali, dato l'elevato numero di specie esistenti, effettuare piccoli saggi prima di passare a trattare superfici più ampie.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

EPIK® SL

Insetticida-aficida sistemico
in formulazione liquida

Classificazione IRAC: Gruppo 4A

EPIK SL - Composizione:

- Acetamiprid puro g 4,67 (=50 g/l)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Sospetto di nuocere al feto (H361d). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410).

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non disperdere nell'ambiente (P273). Indossare guanti/indumenti protettivi. (P280). In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico (P308+P313). Raccogliere la fuoriuscita (P391). Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali in accordo alla regolamentazione nazionale (P501). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:

SIPCAM ITALIA S.p.A.

Sede legale: via Carroccio 8 – Milano

Tel. +39 02/353781

Officine di produzione e/o confezionamento:

SIPCAM OXON S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

SIPCAM Inagra SA - Sueca (Spagna)

KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)

ALTHALLER ITALIA S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

INDUPHARMA S.R.L. - Via Sorgaglia n. 40 - 35020 Arre (PD)

CHEMIA S.p.A. – Via statale, 327 – Dosso – Terre del Reno (FE)

DIACHEM S.p.A. – via Mozzanica 9/11 – 24043 Caravaggio (BG)

FERBI S.r.l. – viale 1° Maggio – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

PRODOTTO FITOSANITARIO:

Autorizzazione Ministero della Salute n. 16325 del 26.02.2015

Distribuito da:

ITAL-AGRO S.r.l. – Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: ml 1,5–3–5–7,5–10–15–20–25–50–100

Partita n.:

® marchio registrato



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Usare guanti adatti durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto. Indossare guanti, tuta protettiva standard e calzature antinfortunistiche (o stivali di sicurezza) durante l'applicazione del prodotto. Non rientrare nelle aree trattate prima che la coltura risulti completamente asciutta. Indossare guanti e abbigliamento da lavoro prima di effettuare eventuali lavorazioni manuali sulle colture trattate.

Per proteggere gli organismi acquatici seguire le seguenti misure di mitigazione:

- rispettare una fascia non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 metri per pomacee e pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio, amarena e prugnolo, 20 metri per agrumi, vite da vino e da tavola, fragole;
- rispettare una fascia vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di 20 metri per olivo, insalate (dolcetta/valerianella/gallinella, rucola, prodotti baby leaf), portulache ed erbe fresche, 10 metri per solanacee, cucurbitacee con buccia commestibile, cucurbitacee con buccia non commestibile, legumi freschi e da granella, carciofo, patata, frumento, tabacco, floreali ed ornamentali e vivai di piante madri di vite.

Per proteggere gli uccelli evitare l'irrigazione mediante aspersione degli ortaggi a foglia fino ad un giorno dopo l'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE**